

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

РЕЛЦЕР**Регистрационный номер****Торговое название препарата:** Релцер**Международное непатентованное или группировочное название:****Лекарственная форма:** таблетки**Состав:**

Одна таблетка содержит:

Активные ингредиенты

Сухой алюминия гидроксид - 250 мг, магния гидроксид - 250 мг, симетикон - 40 мг, солодки корней экстракт деглицирризинированный сухой - 420 мг.

Вспомогательные ингредиенты:

сахароза, натрия сахаринат, метилпарагидроксибензоат (метилпарабен), пропилпарагидроксибензоат (пропилпарабен), магния стеарат, какао-бобы, тальк, крахмал кукурузный, повидон - К30, аниса семян масло, мяты перечной листьев масло.

Описание - светло-коричневого цвета с мраморностью круглые, плоские таблетки с фаской, со специфическим запахом.**Фармакотерапевтическая группа**

антацидное средство + ветрогонное средство.

Код АТХ: A02AF02.**Фармакологическое действие**

Антацидный препарат с компонентом, уменьшающим метеоризм. Нейтрализует свободную соляную кислоту, что приводит к уменьшению переваривающей активности желудочного сока. Не вызывает вторичной гиперсекрецию желудочного сока. Оказывает адсорбирующее и обволакивающее действие, уменьшая влияние повреждающих факторов на слизистую оболочку. Симетикон, входящий в состав препарата, уменьшает газообразование в кишечнике. Солодки корней экстракт деглицирризинированный усиливает защитное действие слизистой оболочки желудка, способствуя регенерации слизистых клеток, улучшая качество и количество слизи, а также оказывает спазмолитическое действие.

Препарат ускоряет заживление язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

Фармакокинетика

Абсорбция низкая.

Показания к применению

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения;
- острый гастрит;



- хронический гастрит;
- гастродуоденит с нормальной или повышенной секреторной функцией в фазе обострения;
- грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофаргит;
- профилактика и лечение диспептических явлений, возникающих в результате применения нестероидных противовоспалительных средств и глюкокортикостероидов;
- дискомфорт или боли в эпигастрии, диспептические явления (изжога, кислая отрыжка), возникающие после погрешностей в диете, избыточного употребления кофе, алкоголя, никотина.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, непереносимость фруктозы, гипофосфатемия, выраженное нарушение функции почек, болезнь Альцгеймера, беременность, период лактации, детский возраст до 10 лет.

Способ применения и дозы

Таблетку следует разжевать и запить водой.

Взрослым и детям старше 15-летнего возраста назначают по 1 или 2 таблетки 3-4 раза в день ежедневно после еды или по мере надобности.

Детям от 10 до 15 лет назначают половину рекомендованной дозы для взрослых.

Курс лечения в соответствии с назначением врача.

Побочные эффекты

Запор, тошнота, рвота, спазмы желудка, изменение вкусовых ощущений, гипермагниемия, гипофосфатемия, гипокальциемия, гиперкальциемия, остеомаляция, остеопороз, гипералюминемия, энцефалопатия, нефрокальциноз, нарушение функции почек, аллергические реакции. У больных с сопутствующей почечной недостаточностью - жажда, снижения артериального давления, гипорефлексия.

Передозировка

Симптомы

При продолжительном приеме высоких доз возможно образование камней в почках, запор, сонливость, гипермагниемия. Могут наблюдаться также признаки метаболического алкалоза: изменение настроения, онемение или боль в мышцах, нервозность и быстрая утомляемость, неприятные вкусовые ощущения.

Лечение

Необходимо принять меры по быстрому выведению препарата: промыть желудок, вызвать рвоту, принять активированный уголь.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении с препаратом Релцер возможно ослабление терапевтического эффекта антибиотиков группы тетрациклина и ципрофлоксацина, индометацина, салицилатов, аминазина, блокатора гистаминовых H₂-рецепторов, бета-дреноблокаторов, дигоксина, изониазида, кетоконазола.

Релцер снижает и замедляет абсорбцию хлорпромазина, фенитоина, дифлунизана, хинолонов (в т. ч. норфлоксацина, офлоксацина, эноксацина, гредофлоксацина), азитромицина, цефподоксима, пивампициллина, рифампицина, прямых антикоагулянтов, барбитуратов, фексофенадина, дипиридамола, заларегина, желчных



кислот (хенодеоксихолевой и урсодеоксихолевой), пенициллина, препаратов Fe и Li+, хинидина, лансопризола, мексилетина.

При одновременном приеме с препаратами в кишечнорастворимых лекарственных формах повышенная щелочность желудочного сока может привести к ускоренному нарушению оболочки таблетки и вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки.

M-холиноблокаторы, замедляя опорожнение желудка, усиливают и удлиняют действие препарата.

Особые указания

Интервал между приемом Релцера и других лекарственных средств должен составлять 1-2 часа.

При длительном применении (более 14 дней) необходим регулярный врачебный контроль.

Форма выпуска

Таблетки.

По 10 таблеток в контурную безъячейковую упаковку из алюминиевой фольги. 1 упаковку с инструкцией по применению помещают в пачку картонную.

Условия хранения

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель:

«Гленмарк Фармасьютикалз Лтд.»

Гленмарк Хаус Винг-А.Б.Д. Савант Марг, Чакала Офф Вестерн Экспресс Хайвэй Андхери (Ист) Мумбаи, 400099, Индия.

Претензии потребителей направлять в адрес представительства: 115191 Москва, ул. Большая Тульская, дом 10, строение 9, офис № 9509/9510; тел/факс: (495) 723-72-90.

И. о. директора ИДКЭЛС

А. Н. Васильев

Представитель фирмы:
Директор отдела регистрации и
медицинских исследований

